

PSA3 уринен тест



[1]

Притеснявате ли се от рак на простатата?

PSA3 е уринен тест, с който Вашият лекар ще прецени дали е необходима биопсия.

За рака на простатата

- Един от най-често диагностицираните видове рак при мъжете
- Само някои видове рак на простатата са много агресивни и ако са открити навреме могат да бъдат контролирани със съответното лечение
- В ранния стадий, повечето от мъжете нямат никакви симптоми. Следователно, консултирайте се с Вашия лекар за ранна диагностика на този вид рак

Кои тестове диагностицират рано рака на простатата?

- Дигитално ректалният тест (**ДРТ**): извършва се като лекарят вкарва пръст в ректума, за да провери размера на простатата или нейното възможно уголемяване
- Простат специфичен тест (**PSA**): протеин , който се произвежда от простатните клетки . Ако имате проблем с простатата/ като например карцином на простатата, уголемена

простата или инфекция – простатит/ , стойностите на PSA в кръвта се повишават. Тестът се извършва като се вземе малко количество венозна кръв

- Ако Вашият лекар има съмнение на базата на ДРТ и PSA тестовете, той може да Ви препоръча биопсия , за да се установи дали имате карцином . Простатата се сканира с ултразвук и след това се вкарва игла през ректума в самата простата , за да се вземе проба. Тази проба се изследва под микроскоп ,за да се установят/ или не ракови клетки.

Какво представлява тестът PSA 3?

- **PROGENSA PCA3** е генетичен тест за карцином на простатата
- След извършването на рутинен ДРК тест се дава проба от урина
- **PCA3** е специфичен за простатата и за разлика от PSA теста , **PCA3** не се влияе от уголемяването на простатата или други неканцерогенни състояния на простатата
- Заедно с ДРТ и PSA тестовете , **PCA3** може да е полезен за да се определи дали е необходимо да се извърши биопсия
- Ако имате положителен резултат от биопсията , стойността на **PCA3** теста може да даде допълнителна информация за агресивността на карцинома. Това може да бъде полезно да се определи кой вид лечение е наложителен

Кога PCA 3 тестът може да помогне?

- Когато имате увеличени стойности на PSA или други обезпокоителни резултати /например от ДРТ теста/ и трябва да решите дали да правите биопсия или не
- Когато имате негативен резултат от биопсията /няма карцином /, но съмненията за рак остават
- Когато имате положителен резултат от биопсията /има карцином/ и искате да разберете колко агресивен е той
- Когато имате членове от Вашето семейство с рак на простатата
- Когато имате рано установен , неагресивен рак на простатата, активно проследявате състоянието си и искате да установите дали ракът прогресира

Как се извършва PCA3 теста?

- Взема се уринна проба
- Уринната проба се взема след като Вашият лекар е извършил ДРТ теста
- Пробата се анализира от високо-специализирана лаборатория и в рамките на 1-2 седмици, лекарят Ви ще получи резултатите от теста

Как се разчитат резултатите от ПСА3 теста?

1. Ако е открит карцином:

2. Стойността на ПСА3 теста показва вероятността да се открие рак на простатата при биопсия

- Колкото по-висока е стойността на **ПСА3** , толкова по-голяма е вероятността резултатът от биопсията да е положителен
 - Колкото по-ниска е стойността на **ПСА3** теста , толкова по-малка е вероятността биопсията да бъде положителна
- Имайте предвид, че решението да се извърши биопсия зависи също от други фактори като възраст, фамилна обременост и резултатите от ДРТ и PSA тестовете
 - Ако Вие и Вашият лекар решите да не извършите биопсия , можете да повторите ПСА3 теста след 3-6 месеца. Ако няма карцином на простатата , **ПСА3** тестът ще покаже същите резултати /или ще варира незначително във времето/. Ако **ПСА3** тестът покаже доста по-високи стойности, биопсията може да бъде препоръчана

1. Ако целта е лечение на рака

2. ПСА3 тестът може да бъде индикация за агресивността на рака

3. Колкото по-висока е стойността на ПСА3 теста, толкова по-агресивен е ракът на простатата и е необходимо активно лечение като операция или химиотерапия

4. Ако имате рано открит ,неагресивен рак на простатата и се следите активно , ПСА3 тестът може да бъде повторен след 3-6 месеца. Значителното повишаване стойността ПСА3 теста може да покаже, че карциномът става агресивен

Уеб адрес: <https://www.nadejda-bg.net/bg/zdraven-buletin/rsa3-urinen-test>

Връзки

[1]

https://www.nadejda-bg.net/sites/default/files/styles/800px_width/public/default_images/medical_team_small.jpeg?itok=voX13B12